
GENEVE ESTHETIC



Información Prequirurgica y postquirurgica

- Consuma alimentos 2 horas antes del procedimiento
- Traer una mudada de ropa
- No consumir Aspirina 7 días antes del procedimiento
- No consumir AINES (ibuprofeno, Enantyum, Dorival, Pronolol, Sulindaco, entre otras) por aumento del riesgo de sangrado
- No consuma licor 48 horas previas al procedimiento. (Aumenta riesgo de sangrado)
- Traer Faja Postquirurgica
- Si opta por procedimientos grandes: >2 lts: Enviar o traer Laboratorios indicados por medico tratante (Hemograma Completo, Pruebas de coagulación, Glicemia en ayunas, Electrolitos: Sodio, Potasio y Calcio).
- Consuma el antibiótico indicado por el medico con abundante comida y líquidos afín de evitar efectos adversas (gastritis, Reflujo Gastroesofagico, entre otras). (Receta medica se entrega el día del procedimiento).
- En caso de Dolor consumir VO: Lisalgil 500mg TID, Tory 120mg/d, Tramacet 1 Tab BID, Tramal 100mg BID.
- Use la faja como indica medico tratante.
- El primer baño en casa debe ser con agua FRÍA, afín de evitar lesiones externas en piel por calor residual del láser.
- Lave las heridas con JABON ANTIBACTERIAL (opc CLOREXIDINA).
- Cubra heridas con los aposentos indicados por medico tratante.
- Asista a su cita control post quirúrgico y drenaje linfático #1, 24 a 48 horas.
- En casa: Realice drenajes las veces necesarias como se le indica en la sala de operación, y cubra posteriormente las heridas y use la faja.
- Enfermería le explicara y le enseñara métodos de drenajes que usted realizara en su casa.
- La faja se retirara solamente para lavarla.

- Reinicie la actividad física básica (caminar) 24 horas del procedimiento a fin de evitar complicaciones por encamado como: TVP, Estasis venosa, inflamación o dolor.
- Prohibido asolearse (Broncearse), debido a que corre el riesgo de manchar la piel.
- No se realice ningún tratamiento estético y/o consuma algún medicamento sin ser evaluado por su medico tratante.
- En caso de haberse realizados alguna sutura, los puntos se retiraran 7 días posterior al procedimiento.
- En caso de dudas o preguntas en base a la evolución y cuidados de su tratamiento, comunicarse con su medico tratante a cualquiera de nuestras sucursales.

Firma:

Fecha: